

Таблиця 3.1.5 – Урожайність пшениці озимої (т/га) залежно від застосування розчину гумінових та фульвокислот концентрованого (препарати РГФК-1(3)).

№ з/п	Варіант застосування препаратів	Роки			Серед- не	± до контролю
		2019	2020	2021		
Попередник – соняшник						
1	Контроль (без обробки насіння та рослин)	3,84	4,48	5,60	4,64	-
2	Внесення препарату РГФК-1 у фазі коло- сіння рослин (норма 1,5 л/га) + фунгіцид (Абакус)	4,10	4,68	6,15	4,98	+0,34
3	Внесення препарату РГФК-3 у фазі коло- сіння рослин (норма 1,5 л/га) + фунгіцид (Абакус)	4,21	4,78	6,32	5,11	+0,47
4	Внесення препарату РГФК-1 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га)	4,17	4,67	6,03	4,96	+0,32
5	Внесення препарату РГФК-3 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га)	4,24	4,56	6,01	4,94	+0,30
6	Фон – N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀ + внесення препарату РГФК-1 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) та N ₆₀ + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га) та N ₃₀	-	5,59	6,36	5,98	+1,34
7	Фон – N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀ + внесення препарату РГФК-3 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) та N ₆₀ + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га) та N ₃₀	-	5,61	6,49	6,05	+1,41
Попередник – горох						
8	Контроль (без обробки насіння та рослин)	5,17	8,01	5,90	6,36	-
9	Внесення препарату РГФК-1 у фазі колосіння рослин (норма 1,5 л/га) + фунгіцид (Абакус)	5,38	8,24	6,33	6,65	+0,29
10	Внесення препарату РГФК-3 у фазі колосіння рослин (норма 1,5 л/га) + фунгіцид (Абакус)	5,33	8,24	6,44	6,67	+0,31
11	Внесення препарату РГФК-1 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га)	5,48	8,14	6,23	6,62	+0,26
12	Внесення препарату РГФК-3 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га)	5,33	8,18	6,20	6,57	+0,21
13	Фон – N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀ + внесення препарату РГФК-1 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) та N ₆₀ + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га) та N ₃₀	-	8,43	5,70	7,07	+0,71
14	Фон – N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀ + внесення препарату РГФК-3 в кінці фази весняного кушіння рослин (доза 1,0 л/га) та N ₆₀ + у фазі колосіння рослин (доза 1,5 л/га) та N ₃₀	-	8,21	5,73	6,97	+0,61